

schülke →



Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry

kodan® Tinktur forte bezbarwny

Skład

100g płynu zawiera substancje czynne: 2-Propanolum (2-propanol) 45,00 g, 1-Propanolum (1-propanol) 10,00 g, 2-Biphenylol (2-difenyloł) 0,20 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

kodan® Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.

Właściwości użytkowe

Lek zawiera substancje odtłuszczające. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Lek o pH 8,74. Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV40).

Zalety

- szybkie działanie i wysychanie
- przedłużone działanie do 24 godzin
- autosterylność
- szerokie spektrum bójcze
- nie podrażnia skóry
- nie wpływa negatywnie na gojenie się ran
- możliwość stosowania u noworodków i niemowląt
- dobra przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu leku
- bardzo dobre właściwości odtłuszczające

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł lub na którykolwiek ze składników leku.

Postać farmaceutyczna

Płyn na skórę, przejrzysty, bezbarwny.

Sposób użycia

kodan® Tinktur forte bezbarwny stosuje się bez rozcieńczenia. Skórę należy dokładnie zwilżyć lekiem z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego lekiem.

Przed zastrzykami i pobieraniem krwi:

czas działania wynosi 15 sekund.

Przed punkcjami:

czas działania wynosi 60 sekund.

Higieniczna dezynfekcja rąk

Przedoperacyjna dezynfekcja skóry:

Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne. Wykąpać lub umyć pacjenta używając np. emulsji myjącej esemtan® lub octenisan®, najlepiej na godzinę przed planowanym terminem zabiegu. Nanosić kodan® Tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę pamiętając o dokładnym zwilżeniu pola operacyjnego. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu leku.

Dezynfekcja skóry przed zastrzykami, punkcjami:

skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć lekiem kodan® Tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.

Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów:

miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym w leku jałowym gazikiem lub z atomizera. Nadmierną ilość leku kodan® Tinktur forte bezbarwny osuszyć jałowym gazikiem.

Właściwości farmakologiczne

Właściwości farmakodynamiczne – grupa farmakoterapeutyczna: leki dezynfekujące i antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol. Kod ATC: D 08 AE 06.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek do stosowania na skórę. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Lek łatwopalny.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (24°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Lek łatwopalny.

Rodzaj i zawartość opakowania

kodan® Tinktur forte bezbarwny dostępny jest w postaci roztworu w opakowaniach o zawartości: 250 ml – butelka z atomizerem, 500 ml, 1 L – butelka.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

kodan® Tinktur forte bezbarwny

Dane farmaceutyczne

Okres ważności: 3 lata.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 022 568 22 02/03, fax: 022 568 22 04
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie MZ nr 13039.

